

## Kritériá indikácie špecializovanej detskej domácej paliatívnej starostlivosti. Skríningové skóre

Skríningové skóre špecializovanej detskej domácej paliatívnej starostlivosti je nástroj, ktorý pomôže ošetrovateľskému lekárovi (primárny pediater, špecialisti) určiť vhodný čas pre prvý rozhovor o cieľoch paliatívnej starostlivosti, naplánovať paliatívne konzílium a stanoviť akútnu indikáciu špecializovaného detského paliatívneho konzília.

Cieľovou skupinou špecializovanej detskej domácej paliatívnej starostlivosti sú deti so život limitujúcimi a/alebo ohrozujúcimi chorobami,

1. ktorých diagnóza je v adresári život limitujúcich chorôb ([www.detskapaliativnastarostlivost.sk](http://www.detskapaliativnastarostlivost.sk))
2. ktorých diagnóza nie je známa, ale klinický stav je závažný a klinické skúsenosti vedú odborníka k záveru, že ide o život limitujúcu/ohrozujúcu chorobu

Povinnosť zhodnotiť Skríningové skóre DDPS má kľúčový odborník, ktorý vzhľadom na diagnózu dieťaťa koordinuje multidisciplinárnu starostlivosť pri stanovení diagnózy a následne vo vhodných intervaloch. Vždy pri významnom zhoršení klinického stavu a minimálne raz ročne.

Vyplnené skríningové skóre DPS je pomôckou pre ošetrojúceho lekára, ktorý sa stará o dieťa so život limitujúcou/ohrozujúcou chorobou. Nenahradzuje klinickú skúsenosť lekára. Po vyplnení skóre lekár môže zvoliť aj iný postup ako odporúča skóre, ktorý odôvodní v dokumentácii dieťaťa.

Skríningový dotazník so záverom kľúčového odborníka je súčasťou dokumentácie, kópia vyplneného dotazníka je poskytnutá rodičovi a odoslaná primárnemu pediatrovi.

### Vyhodnotenie skóre:

1. Skóre  $\geq 10$   
Ošetrojúci lekár dieťaťa oboznámi rodičov a dieťa s cieľmi paliatívnej starostlivosti. Informačné materiály pre rodičov aj odborníkov sú dostupné na [www.detskapaliativnastarostlivost.sk](http://www.detskapaliativnastarostlivost.sk)
2. Skóre  $\geq 15$   
Príprava na začiatok špecializovanej detskej domácej paliatívnej starostlivosti. Odporúčanie a objednanie paliatívneho konzília poskytovaného lekárom špecializovaného detského mobilného paliatívneho tímu v priebehu najbližších 3-6 mesiacov. Konzílium objednáva primárny pediater po vlastnom zhodnotení alebo na odporúčenie iného špecialistu.
3. Skóre  $\geq 25$   
Akútna indikácia paliatívneho konzília  
Objednanie paliatívneho konzília v priebehu 7 dní ([www.detskapaliativnastarostlivost.sk](http://www.detskapaliativnastarostlivost.sk))  
Vhodnosť detskej domácej paliatívnej starostlivosti bude posúdená spoločne po rozhovore lekára špecializovaného mobilného paliatívneho tímu s ošetrovateľským ústavným alebo ambulantným lekárom dieťaťa a rodičmi a následnej spoločnej diskusii. Konzílium objednáva ošetrojúci lekár (primárny pediater alebo špecialista).

Komplexný manažment detského pacienta v domácej paliatívnej starostlivosti

Skríningové skóre špecializovanej detskej paliatívnej starostlivosti

<b>Meno dieťaťa:</b>		<b>Dátum narodenia:</b>	
<b>Diagnóza kód:</b>	<b>Diagnóza slovom:</b>		
<b>Meno odborníka:</b>		<b>Dátum hodnotenia:</b>	
<b>Kontakt:</b>			
<b>Skóre a ďalší postup:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>≥ 10</b> Rodičia sú oboznámení s cieľmi paliatívnej starostlivosti: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> slovne</li> <li><input type="checkbox"/> informačné materiály</li> <li><input type="checkbox"/> webová stránka</li> </ul> </li>   <li>• <b>≥ 15</b> Príprava na začiatok špecializovanej detskej domácej paliatívnej starostlivosti: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> dieťa má objednané paliatívne konzílium na termín: .....</li> <li><input type="checkbox"/> bolo odporučené objednanie paliatívneho konzília cestou primárneho pediatra.</li> </ul> </li>   <li>• <b>≥25</b> Akútna indikácia paliatívneho konzília. (<b>Objednanie paliatívneho konzília v priebehu 7 dní</b>)</li> </ul>			

	<b>Skríningové skóre špecializovanej detskej paliatívnej starostlivosti</b>		<b>Označte krížikom</b>	<b>Skóre</b>
<b>1</b>	<b>Priebeh ochorenia a jeho vplyv na denné aktivity dieťaťa</b>			
1.1	Priebeh ochorenia a jeho vplyv na denné aktivity dieťaťa (v porovnaní s posledným klinickým vyšetrením, resp. počas posledných 4 týždňov života dieťaťa):	Stabilné	<input type="checkbox"/>	0
		Pomaly zhoršujúce sa bez vplyvu na denné aktivity	<input type="checkbox"/>	1
		Nestabilné, s miernym obmedzením denných aktivít	<input type="checkbox"/>	2
		Signifikantné zhoršenie so závažným obmedzením denných aktivít	<input type="checkbox"/>	4
1.2	Zvýšený počet hospitalizácií (>50% v posledných 3 mesiacoch v porovnaní s predchádzajúcim obdobím).	Nie	<input type="checkbox"/>	0
		Áno	<input type="checkbox"/>	3
<b>2</b>	<b>Očakávané výsledky liečby zameranej na ochorenie a nežiaduce účinky liečby</b>			
2.1	Liečba zameraná na ochorenie... (nemyslí sa tým symptómová liečba s chorobou súvisiacich komplikácií ako napr. bolesť, únava, dyspnoe...)	... je kuratívna	<input type="checkbox"/>	0
		... kontroluje ochorenie a predlžuje život pacienta s dobrou kvalitou života	<input type="checkbox"/>	1
		...nedokáže vyliečiť ochorenie, ale má pozitívny efekt na kvalitu života	<input type="checkbox"/>	2
		... nekontroluje ochorenie a nemá pozitívny efekt na kvalitu života	<input type="checkbox"/>	4
2.2	Zátťaž liečby (zátťaž znamená vedľajšie účinky liečby a s liečbou súvisiace faktory, ktoré sú z pohľadu pacienta alebo rodiny vnímané ako	Žiadna alebo minimálna zátťaž	<input type="checkbox"/>	0
		Nízky stupeň zátáže	<input type="checkbox"/>	1
		Stredný stupeň zátáže	<input type="checkbox"/>	2

**Komplexný manažment detského pacienta v domácej paliatívnej starostlivosti**

	záťaž, napr. pobyt v nemocnici, atď...)	Vysoký stupeň záťaže	<input type="checkbox"/>	4
<b>3</b>	<b>Symptómové a psychologické zaťaženie dieťaťa</b>			
3.1	Intenzita symptómov a náročnosť symptómovej kontroly (počas posledných 4 týždňov)	Pacient je asymptomatický	<input type="checkbox"/>	0
		Symptóm(y) sú mierne a sú ľahko kontrolovateľné	<input type="checkbox"/>	1
		Symptóm(y) sú strednej intenzity a sú kontrolovateľné	<input type="checkbox"/>	2
		Symptóm(y) sú vysokej intenzity alebo sú náročne kontrolovateľné (neplánované hospitalizácie alebo ambulatné návštevy, symptómové krízy...)	<input type="checkbox"/>	4
3.2	Psychologická záťaž pacienta súvisiaca so symptómami	Žiadna	<input type="checkbox"/>	0
		Mierna	<input type="checkbox"/>	1
		Stredná	<input type="checkbox"/>	2
		Významná	<input type="checkbox"/>	4
3.3	Psychologická záťaž rodičov alebo rodiny súvisiaca so symptómami alebo utrpením dieťaťa	Žiadna	<input type="checkbox"/>	0
		Mierna	<input type="checkbox"/>	1
		Stredná	<input type="checkbox"/>	2
		Významná	<input type="checkbox"/>	4
<b>4</b>	<b>Preferencie/potreby pacienta alebo rodičov. Preferencie zdravotníckeho pracovníka.</b>			
4.1	Pacient/rodičia si želajú paliatívnu starostlivosť alebo vyjadrili potreby, ktoré dokáže najlepšie naplniť paliatívna starostlivosť.	Nie (prejdite na 4.2)	<input type="checkbox"/>	0
		Áno (neodpovedajte na 4.2)	<input type="checkbox"/>	4
4.2	Vy alebo Váš zdravotnícky tím cítite, že pacient by mohol profitovať z paliatívnej starostlivosti.	Nie	<input type="checkbox"/>	0
		Áno	<input type="checkbox"/>	4
<b>5</b>	<b>Odhadovaná dĺžka života</b>		<input type="checkbox"/>	
5.1	Odhadovaná dĺžka života	Niekoľko rokov	<input type="checkbox"/>	0
		Mesiace až 1-2 roky	<input type="checkbox"/>	1
		Týždne až mesiace (neodpovedajte na 5.2)	<input type="checkbox"/>	3
		Dni až týždne (neodpovedajte na 5.2)	<input type="checkbox"/>	4
5.2	„Boli by ste prekvapení ak by dieťa náhle zomrelo v najbližších 6 mesiacoch?“	Áno	<input type="checkbox"/>	0
		Nie	<input type="checkbox"/>	2
		<b>Celkové skóre</b>	<input type="checkbox"/>	....